

膀胱がん GEM+CBDCA (K28D1,2,8,15)

day (1)				day (2)				day (8,15)				day (28)				
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			休薬完了				
薬品	デキサート (3.3)	2	A	薬品	グラニセロン (1)	1	A	薬品	デキサート (3.3)	2	A					
	生食 (100)	1	本		デキサート (3.3)	1	A		生食 (100)	1	本					
					デキサート (1.65)	1	A									
					生食 (100)	1	本									
点滴速度	200ml/h			点滴速度	200ml/h			点滴速度	200ml/h							
コメント等	1番目			コメント等	1番目			コメント等	1番目							
手技	点滴静注			手技	点滴静注			手技	点滴静注							
薬品	ゲムシタピン	1000	mg/m ²	薬品	カルボプラチン	5	AUC	薬品	ゲムシタピン	1000	mg/m ²					
	生食 (100)	1	本		5%ブドウ糖 (250)	1	本		生食 (100)	1	本					
点滴速度	200ml/h			点滴速度	200ml/h			点滴速度	200ml/h							
コメント等	2番目			コメント等	2番目			コメント等	2番目							
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射							
薬品	生食 (100)	1	本	薬品	生食 (100)	1	本	薬品	生食 (100)	1	本					
点滴速度				点滴速度				点滴速度								
コメント等	3番目			コメント等	3番目			コメント等	3番目							
手技				手技				手技								
薬品				薬品				薬品								
点滴速度				点滴速度				点滴速度								
コメント等				コメント等				コメント等								
手技				手技				手技								
薬品				薬品				薬品								
点滴速度				点滴速度				点滴速度								
コメント等				コメント等				コメント等								
メモ	<内服制吐剤必要> アプレピタント 125mg(day2) 80mg(day3,4) 状況によりデカドロン4mg分2 (day3-5) 追加															