

大腸がん FOLFOXIRI (K14D1)

day(1)				day(14)			
手技	点滴注射			手技	インフューザーポンプ		
薬品	アロキシ	1	A	薬品	フルオロウラシル	2400	mg/m ²
	デキサート (3.3)	3	A		生食 (100)	1	本
	フロイメンド	1	V				
	生食 (100)	1	本				
点滴速度	200ml/h			点滴速度			
コメント等	メインルート1番目			コメント等			
手技	点滴注射			手技			
薬品	イリノテカン	150	mg/m ²	薬品			
	生食 (500)	1	本				
点滴速度	350ml/h			点滴速度			
コメント等	メインルート2番目			コメント等			
手技	点滴注射			手技			
薬品	レボロリナート	200	mg/m ²	薬品			
	5%ブドウ糖 (250)	1	本				
点滴速度	125ml/h			点滴速度			
コメント等	側管1番目			コメント等			
手技	点滴注射			手技			
薬品	オキサリプラチン	85	mg/m ²	薬品			
	5%ブドウ糖 (250)	1	本				
点滴速度	125ml/h			点滴速度			
コメント等	メインルート3番目			コメント等			
手技	点滴注射			手技			
薬品	生食 (100)	1	本	薬品			
点滴速度				点滴速度			
コメント等	側管2番目			コメント等			
メモ	<内服制吐剤必要> デカドロン錠8mg分2 (day2-4)						

休薬完了