

# 大腸がん CPT-11+Cetuximab (K28D1,8,15,22)

day( 1,15)				day( 8,22)				day(28)						
手技	点滴注射			手技	点滴注射			休薬完了						
薬品	グラニセトロン (1)	1	A	薬品	デキサート (1.65)	1	A							
	デキサート (3.3)	1	A		ネオレスタール	1	A							
	デキサート (1.65)	1	A		生食 (100)	1	本							
	ネオレスタール	1	A											
	生食 (100)	1	本											
点滴速度	200ml/h			点滴速度	400ml/h									
コメント等	1番目			コメント等	1番目									
手技	点滴注射			手技	点滴注射									
薬品	アーピタックス	250	mg/m	薬品	アーピタックス	250	mg/m							
	生食 (250)	1	本		生食 (250)	1	本							
点滴速度	250ml/h			点滴速度	250ml/h									
コメント等	2番目			コメント等	2番目									
手技	点滴注射			手技	点滴注射									
薬品	生食 (50)	1	本	薬品	生食 (100)	1	本							
点滴速度	全開			点滴速度										
コメント等	3番目			コメント等	3番目									
手技	点滴注射			手技										
薬品	イリノテカン	150	mg/m	薬品										
	生食 (500)	1	本											
点滴速度	350ml/h			点滴速度										
コメント等	4番目			コメント等										
手技	点滴注射			手技										
薬品	生食 (100)	1	本	薬品										
点滴速度				点滴速度										
コメント等	5番目			コメント等										
メモ	<内服制吐剤必要> アプレピタント (day1,15) 125mg (day2,3,16,17) 80mg 状況によりデカドロン4mg分2 (day2-4,16-18) 追加													