

大腸がん FOLFIRI+Panitumumab (K14D1)

day(1)				day(14)			
手技	点滴注射			手技	点滴注射		
薬品	生食 (50)	1	本	薬品	イリノテカン 生食 (500)	150 1	mg/m ² 本
点滴速度				点滴速度	350ml/h		
コメント等	メインルート1番目			コメント等	メインルート2番目		
手技	点滴注射			手技	点滴注射		
薬品	グラニセロン (1)	1	A	薬品	フルオロウラシル 生食 (50)	400 1	mg/m ² 本
	デキササート (3.3)	1	A				
	デキササート (1.65)	1	A				
	フロイメンド	1	A				
	生食 (100)	1	本				
点滴速度	200ml/h			点滴速度	全開		
コメント等	側管1番目			コメント等	側管5番目		
手技	点滴注射			手技	点滴注射		
薬品	ベクティビックス 生食 (100)	6 1	mg/kg 本	薬品	生食 (100)	1	本
点滴速度	100ml/h			点滴速度			
コメント等	側管2番目			コメント等	側管6番目		
手技	点滴注射			手技	インフューザーポンプ		
薬品	生食 (100)	1	本	薬品	フルオロウラシル 生食 (100)	2400 1	mg/m ² 本
点滴速度	初回 : 100ml/h			点滴速度	2.5ml/h		
コメント等	側管3番目			コメント等			
手技	点滴注射			手技			
薬品	レボホリナート 生食 (100)	200 1	mg/m ² 本	薬品			
点滴速度	50ml/h			点滴速度			
コメント等	側管4番目			コメント等			
メモ	<制吐薬> 状況によりデカドロン4mg分2 (day2-4) 追加						

休薬完了