

肺がん Pembrolizumab+CBDCA+Pemetrexed (K21D1)

day(1)				day(21)			
手技	点滴注射			手技	点滴注射		
薬品	グリセトロン(1)	1	A	薬品	5%ブドウ糖(250)	1	本
	デキサート(3.3)	1	A		カルボプラチン	5	AUC
	デキサート(1.65)	1	A				
	生食(100)	1	本				
点滴速度	200ml/h			点滴速度	200ml/h		
コメント等	1番目			コメント等	5番目		
手技	点滴注射			手技	点滴注射		
薬品	キイトルーダ	200	mg/body	薬品	生食(100)	1	本
	生食(100)	1	本				
点滴速度	200ml/h			点滴速度			
コメント等	2番目			コメント等	6番目		
手技	点滴注射			手技			
薬品	生食(50)	1	本	薬品			
点滴速度				点滴速度			
コメント等	3番目			コメント等			
手技	点滴注射			手技			
薬品	生食(100)	1	本	薬品			
	アリムタ	500	mg/m ²				
点滴速度	500ml/h			点滴速度			
コメント等	4番目			コメント等			
メモ	<p><投与必要> パンピタン末1g分1経口（初回投与の7日以上前～最終投与後22日まで） メチコバル注1.000μg筋注（初回投与7日前および3kurごと） <内服制吐剤必要> アプレピタント（day1）125mg（day2,3）80mg 状況によりデカドロン4mg分2（day2-4）追加</p>						

休薬完了