

肺がん CBDCA+Pemetrexed+BV (K21D1)

day(1)				day(21)			
手技	点滴注射						
薬品	デキサート (3.3)	2	A				
	グラニセトロン (1)	1	A				
	生食 (100)	1	本				
点滴速度	200ml/h						
コメント等	1番目						
手技	点滴注射						
薬品	生食 (100)	1	本				
	アリムタ	500	mg/m ²				
用法							
点滴速度	500ml/h						
コメント等	2番目						
手技	点滴注射						
薬品	5%ブドウ糖 (250)	1	本				
	カルボプラチン	5	AUC				
用法							
点滴速度	200ml/h						
コメント等	3番目						
手技	点滴注射						
薬品	ペバシズマブ	15	mg/kg				
	生食 (100)	1	本				
用法							
点滴速度	100ml/h						
コメント等	4番目						
手技	点滴注射						
薬品	生食 (100)	1	本				
用法							
点滴速度							
コメント等	5番目						
メモ	<p><投与必要> パンビタン末1g分1経口（初回投与の7日以上前～最終投与後22日まで） メチコバル注1000μg筋注（初回投与7日前および3kurごと） <内服制吐剤必要> アプレピタント（day1）125mg、（day2,3）80mg 状況によりデ カドロン4mg分2（day2-4）追加</p>						

休薬完了