

肺がん CBDCA+w-PTX (K21D1,8,15)

day(1)				day(8,15)				day(21)				
手技	点滴注射			手技	点滴注射			休薬完了				
薬品	生食(50)	1	本	薬品	生食(50)	1	本					
	デキサート(3.3)	2	A		デキサート(3.3)	2	A					
	デキサート(1.65)	1	A		デキサート(1.65)	1	A					
	ファモチジン	1	A		ファモチジン	1	A					
	ネオレスタール	1	A		ネオレスタール	1	A					
点滴速	200ml/h			点滴速度	200ml/h							
コメント等	1番目			コメント等	1番目							
手技	点滴注射			手技	点滴注射							
薬品	グラニセトロン(1)	1	A	薬品	生食(100)	1	本					
	生食(100)	1	本									
点滴速	200ml/h			点滴速度	200ml/h							
コメント等	2番目			コメント等	2番目							
手技	点滴注射			手技	点滴注射							
薬品	5%ブドウ糖(250)	1	本	薬品	5%ブドウ糖(250)	1	本					
	バクリタキセル	70	mg/ml		バクリタキセル	70	mg/ml					
点滴速	200ml/h			点滴速度	200ml/h							
コメント等	3番目			コメント等	3番目							
手技	点滴注射			手技	点滴注射							
薬品	5%ブドウ糖(250)	1	本	薬品	生食(100)	1	本					
	カルボプラチン	5	AUC									
点滴速	200ml/h			点滴速度								
コメント等	4番目			コメント等	4番目							
手技	点滴注射			手技								
薬品	生食(100)	1	本	薬品								
点滴速				点滴速度								
コメント等	5番目			コメント等								
	フラッシュ用											
メモ	<内服制吐剤必要> アプレピタント(day1) 125mg (day2,3) 80mg 状況によりデカドロン4mg分2 (day2-4) 追加											