

悪性リンパ腫 B-G初回 (K28D1,2,8,15)

day(1)				day(2)				day(8,15)				day(28)			
手技	点滴静注			手技	点滴静注			手技	点滴静注			休薬完了			
薬品	生食(500)	1	本	薬品	生食(500)	1	本	薬品	生食(500)	1	本				
点滴速度	60ml/h			点滴速度	60ml/h			点滴速度	60ml/h						
コメント等	1番目			コメント等	1番目			コメント等	1番目						
手技	点滴静注			手技	点滴静注			手技							
薬品	グラネセトロンバッグ デキサート(3.3)	1 5	本 A	薬品	グラネセトロンバッグ デキサート(3.3)	1 2	本 A	薬品							
点滴速度	200ml/h			点滴速度	200ml/h			点滴速度							
コメント等	2番目			コメント等	2番目			コメント等							
手技	点滴静注			手技	点滴静注			手技	点滴静注						
薬品	トリアキシン 蒸留水(100) * 溶解用 生食(250)	90 1 1	mg/ml V 本	薬品	トリアキシン 蒸留水(100) * 溶解用 生食(250)	90 1 1	mg/ml V 本	薬品	ガザイバ 生食(250)	1000 1	mg/body 本				
点滴速度	250ml/h			点滴速度	250ml/h			点滴速度	開始30分前に前投薬あり ~30分 25ml/h 30分~1時間 50ml/h 1~1.5時間 75ml/h						
コメント等	3番目			コメント等	3番目			コメント等	1.5時間以降 最大100ml/hまで可 2番目						
手技	点滴静注			手技				手技							
薬品	ガザイバ 生食(250)	1000 1	mg/body 本	薬品				薬品							
点滴速度	開始30分前に前投薬あり ~30分 12ml/h 30分~1時間 25ml/h 1~1.5時間 37ml/h 1.5~2時間 50ml/h 2~2.5時間 62ml/h 2.5~3時間 75ml/h 3~3.5時間 87ml/h 3.5時間以降 最大100ml/hまで可			点滴速度				用法							
コメント等	4番目			コメント等				点滴速度							
メモ	ガザイバ投与30分前 アタラックスP25mg、ポララミン2mg、アセトアミノフェン1000mgの前投与あり														