卵巣がん、子宮体・子宮頸がん TC (PTX+CBDCA) (K21D1)

| day (1) | | | | day (21) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------|----------|
| 手技 | 点滴注射 | | | |
| 薬品 | グラニセトロン(1) | 1 | Α | |
| | デキサート(3.3) | 5 | A | |
| | ファモチジン | 1 | A | |
| | ネオレスタール | 1 | A | |
| | 生食(100) | 1 | 本 | |
| 点滴速度 | | - | | |
| | 1来口 | | | |
| コメント等 | | | | |
| 手技 | 点滴注射 | | | |
| | 生食(100) | 1 | 本 | |
| 薬品 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 点滴速度 | 200ml/h | | | |
| コメント等 | 2来日 | | | |
| _ | | | | |
| 手技 | 点滴注射 | | | |
| 薬品 | 生食(500) | 1 | 本 | |
| | パクリタキセル | 175 | mg/mੈ | |
| *************************************** | | | | 休薬完了 |
| | | | | |
| 点滴速度 | 170m l / h | | | |
| コメント等 | 3番目 | | | |
| | | | | |
| 手技 | 点滴注射 | | | |
| | 5%ブドウ糖 (250) | 1 | 本 | |
| 薬品 | カルボプラチン | 5 | AUC | |
| | | | | |
| | 200 1 //- | | | |
| | 200m l / h | | | |
| コメント等 | 4番目 | | | |
| 工士 | 上流注射 | | | |
| 手技 | 点滴注射 生食(100) | 1 | 本 | |
| 薬品 | 工尺 (100) | Т | 4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 点滴速度 | | | | |
| 从 | 5.悉日 | | | |
| コメント等 | J田口 | | | |
| | | | | |
| | <内服制吐剤必要> | | | |
| λ£ | アプレピタント: (day1) 125mg、(day2,3) 80mg | | | |
| | | | | |
| | 状況によりデカドロン錠4mg分2(day2-4)追加 | | | |
| | | | J | , , |