

食道がん FP (5-FU+CDDP) (K28D1,2-5)

day (1)				day (2-3)				day (4)				day (5)							
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射		
薬品	生食 (50)	1	本	薬品	ソルデム 3A (500)	1	本	薬品	フルオロウラシル 生食 (1000)	800 1	mg/m ² 本	薬品	フルオロウラシル 生食 (1000)	800 1	mg/m ² 本	薬品	フルオロウラシル 生食 (1000)	800 1	mg/m ² 本
点滴速度	メインルート1番目			点滴速度	500ml/h			点滴速度	250ml/h			点滴速度	45~55ml/h			点滴速度	45~55ml/h		
コメント等				コメント等	側管1番目			コメント等	側管6,7番目			コメント等	メインルート			コメント等	メインルート		
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射		
薬品	フルオロウラシル 生食 (1000)	800 1	mg/m ² 本	薬品	ソルデム 3A (500) 硫酸Mg補正液	1 8	本 ml	薬品	デキサート (3.3) デキサート (1.65) 生食 (100)	2 1 1	A A 本	薬品	デキサート (3.3) デキサート (1.65) 生食 (100)	2 1 1	A A 本	薬品	デキサート (3.3) 生食 (100)	1 1	本
点滴速度	45~55ml/hで調整可			点滴速度	500ml/h			点滴速度	200ml/h			点滴速度	200ml/h			点滴速度	45~55ml/h		
コメント等	メインルート2番目			コメント等	側管2番目			コメント等	側管1番目			コメント等	側管			コメント等	側管		
手技				手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技				day (28) 休薬完了			
薬品				薬品	アロキシ デキサート (3.3) 生食 (100)	1 3 1	V A 本	薬品	ソルデム 3A (500)	1	本	薬品							
点滴速度				点滴速度	200ml/h			点滴速度	250ml/h			点滴速度							
コメント等				コメント等	側管3番目			コメント等	側管2,3番目			コメント等							
手技				手技	点滴注射			手技				手技							
薬品				薬品	マンニトール	1	本	薬品				薬品							
点滴速度				点滴速度	500ml/h			点滴速度				点滴速度							
コメント等				コメント等	側管4番目			コメント等				コメント等							
手技				手技	点滴注射			手技				手技							
薬品				薬品	シスプラチン 生食 (500)	80 1	mg/m ² 本	薬品				薬品							
点滴速度				点滴速度	250ml/h			点滴速度				点滴速度							
コメント等				コメント等	側管5番目			コメント等				コメント等							
メモ	<内服制吐剤必要> アブレピタント125mg(day1) 80mg(day2,3)																		