

# 多発性骨髄腫 ELd (1,2kur目) (K28D1,8,15,22) (Pod 1-21)

day(1,8,15,22)				day(28)		
手技	点滴注射			手技	点滴注射	
薬品	生食(250)	1	本	薬品	生食(100)	1 本
				薬品	デキサート(3.3)	2 A
				薬品	ファモチジン	1 A
				薬品	ネオレスタール	1 A
点滴速度	20ml/h			点滴速度	200ml/h	
コメント等				コメント等		
手技				手技	側管1番目	
薬品				手技	点滴注射	
				薬品	生食(100)	1 本
				薬品		
点滴速度				点滴速度	100ml/h	
コメント等				コメント等		
手技				手技	点滴注射	
薬品				薬品	エムプリシティ	10 mg/kg
				薬品	蒸留水(100ml)*溶解用	1 本
				薬品	生食(250)	1 本
点滴速度				点滴速度	1kur目初回	開始~30分 30ml/h
						30分~60分 60ml/h
						60分以降 120ml/h
				点滴速度	1kur目2回目	開始~30分 180ml/h
						30分以降 240ml/h
					1kur目3,4回目及び2kur目以降	300ml/h
コメント等				コメント等	45-90分前に前投薬あり	
手技				手技	側管3番目	
薬品				薬品		
				薬品		
点滴速度				点滴速度		
コメント等				コメント等		
メモ	Day1,8,15,22 レナデックス28mg(エムプリシティ投与3-24時間前) 75歳以上減量基準あり					
	Day1,8,15,22 アセトアミノフェン300-1000mg(エムプリシティ投与45-90分前)					
	レブラミド25mg (Day1-21 7日間休薬)					

休薬完了