

# 多発性骨髄腫 ELd (3kur目以降) (K28D1,15) (Pod 1-21)

day(1,15)				day(8,22)				day(28)			
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技			
薬品	生食(250)	1	本	薬品	生食(100)	1	本	薬品			
					デキサート(3.3)	2	A				
					ファモチジン	1	A				
					ネオレスタール	1	A				
点滴速度	20ml/h			点滴速度	200ml/h			点滴速度			
コメント等				コメント等				コメント等			
	メインルート1番目				側管1番目						
手技				手技	点滴注射			手技			
薬品				薬品	生食(100)	1	本	薬品			
点滴速度				点滴速度	100ml/h			点滴速度			
コメント等				コメント等				コメント等			
					側管2番目						
手技				手技	点滴注射			手技			
薬品				薬品	エムプリシティ	10	mg/kg	薬品			
					蒸留水(100ml)*溶解用	1	本				
					生食(250)	1	本				
点滴速度				点滴速度	300ml/h			点滴速度			
コメント等				コメント等				コメント等			
					45-90分前に前投薬あり						
手技				手技				手技			
薬品				薬品				薬品			
点滴速度				点滴速度				点滴速度			
コメント等				コメント等				コメント等			
メモ	Day1 レナデックス28mg (エムプリシティ投与3~24時間前) 75歳以上減量基準あり			レナデックス錠40mg内服							
	Day1 アセトアミノフェン300-1000mg (エムプリシティ投与45-90分前)										
	レブラミド25mg (Day1-21 7日間休薬)										

休薬完了