

多発性骨髄腫 EPd (1,2kur目) (K28D1,8,15,22) (Pod 1-21)

day(1,8,15,22)				day(1,8,15,22)				day(28)			
手技	点滴注射			手技	点滴注射			休薬完了			
薬品	生食(250)	1	本	薬品	生食(100)	1	本				
点滴速度	20ml/h			薬品	デキサート(3.3)	2	A				
コメント等	メインルート			薬品	フェチジン	1	A				
手技				薬品	ネオレスタール	1	A				
薬品				点滴速度	200ml/h						
点滴速度				コメント等	同時にアセトアミノフェンを内服						
コメント等				手技	点滴注射						
手技				手技	点滴注射						
薬品				薬品	生食(100)	1	本				
点滴速度				点滴速度	100ml/h						
コメント等				コメント等	側管2番目						
手技				手技	点滴注射						
薬品				薬品	エムプリシティ	10	mg/kg				
点滴速度				薬品	蒸留水(100ml)*溶解用	1	瓶				
コメント等				薬品	生食(250)	1	本				
手技				点滴速度	1kur目初回	開始~30分	30ml/h				
薬品				点滴速度		30分~60分	60ml/h				
点滴速度				点滴速度	1kur目2回目	開始~30分	180ml/h				
コメント等				点滴速度		30分以降	240ml/h				
手技				点滴速度	1kur目3.4回目および2kur目以降		300ml/h				
薬品				コメント等	投与45-90分前に前投薬あり						
点滴速度				コメント等	側管3番目						
コメント等				手技							
手技				薬品							
薬品				点滴速度							
点滴速度				コメント等							
コメント等				コメント等							
メモ	Day1,8,15,22 レナデックス28mg (エムプリシティ投与3-24時間前 75歳以上減量基準あり)										
	Day1,8,15,22 アセトアミノフェン300-1000mg (エムプリシティ投与45-90分前)										
	ポマリスト4mg/day (Day1-21 7日間休薬)										