

多発性骨髄腫 EPd (3kur目以降) (K28D1) (Pod 1-21)

day(1)				day(1)				day(8,15,22)				day(28)			
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技							
薬品	生食(250)	1	本	薬品	生食(100)	1	本	薬品							
					デキサート(3.3)	2	A								
					ファモチジン	1	A								
					ネオレスタール	1	A								
点滴速度	20ml/h			点滴速度	200ml/h			点滴速度							
コメント等	メインルート			コメント等	同時にアセトアミノフェンを内服			コメント等							
					側管1番目										
手技				手技	点滴注射			手技							
薬品				薬品	生食(100)	1	本	薬品							
点滴速度				点滴速度	100ml/h			点滴速度							
コメント等				コメント等	側管2番目			コメント等							
					点滴注射										
薬品				薬品	エムプリシティ	20	mg/kg	薬品							
					蒸留水(100ml)*溶解用	1	瓶								
					生食(250)	1	本								
点滴速度				点滴速度	3kur目 開始~30分	180ml/h		点滴速度							
					30分以降	240ml/h									
					4kur目以降	300m/h									
コメント等				コメント等	投与45-90分前に前投薬あり			コメント等							
					側管3番目										
手技				手技				手技							
薬品				薬品				薬品							
点滴速度				点滴速度				点滴速度							
コメント等				コメント等				コメント等							
メモ	Day1 レナデックス28mg(エムプリシティ投与3-24時間前 75歳以上減量基準あり)							レナデックス錠40mg							
	Day1,8,15,22 アセトアミノフェン300~1000mg(エムプリシティ投与45-90分前)														
	ポマリスト4mg/day (Day1-21 7日間休薬)														

休薬完了