

多発性骨髄腫 DaraMPB (2-9kur目) (K42D1,8,22,29)

day(1,22)				day(1,22)				day(8,29)				day(42)			
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	皮下注射			休薬完了			
薬品	生食(250)	1	本	薬品	生食(100)	1	本	薬品	バルケイド	1.3	mg/m ²				
					デキサート(3.3)	5	A		生食(20)	1	本				
点滴速度	20ml/min			点滴速度	100ml/h			点滴速度							
コメント等	メインルート			コメント等	側管1番目			コメント等							
手技				手技	点滴注射			手技							
薬品				薬品	生食(100)	1	本	薬品							
点滴速度				点滴速度	100ml/h			点滴速度							
コメント等				コメント等	側管2番目			コメント等							
手技				手技	点滴注射			手技							
薬品				薬品	ダラザレックス	16	mg/kg	薬品							
点滴速度				点滴速度	生食(500)	1	袋	点滴速度							
					下記参照										
					側管3番目										
手技				手技	皮下注射			手技							
薬品				薬品	バルケイド	1.3	mg/m ²	薬品							
					生食(20)	1	本								
点滴速度				点滴速度				点滴速度							
コメント等				コメント等				コメント等							
メモ	ダラザレックス：投与1-3時間前にアセトアミノフェン1000mg、ポララミン2mg、モンテルカスト10mgを前投与 投与速度:開始~100ml/h 1時間~150ml/h 2時間~200ml/h 内服併用薬 アルケラン9mg/m ² (day1-4) プレドニゾン60mg/m ² (day2-4)														