

# 多発性骨髄腫 DLd (1kur目) (K28D1,8,15,22) (Pod 1-21)

day(1)				day(8,15,22)				day(28)			
手技	点滴注射			手技	点滴注射			休薬完了			
薬品	生食 (500)	1	本	薬品	生食 (250)	1	本				
点滴速度	20ml/h			点滴速度	20ml/h						
コメント等				コメント等							
手技	点滴注射			手技	点滴注射						
薬品	生食 (100) デキサート (3.3)	1 10	本 A	薬品	生食 (100) デキサート (3.3)	1 10	本 A				
用法				用法							
点滴速度	110ml/h			点滴速度	110ml/h						
コメント等				コメント等							
手技	点滴注射			手技	点滴注射						
薬品	生食 (100)	1	本	薬品	生食 (100)	1	本				
用法				用法							
点滴速度	50ml/h			点滴速度	50ml/h						
コメント等				コメント等							
手技	点滴注射			手技	点滴注射						
薬品	ダラザレックス 生食 (500)	16 2	mg/kg 本	薬品	ダラザレックス 生食 (500)	16 1	mg/kg 本				
点滴速度	開始～ 50ml/h 1時間～ 100ml/h 2時間～ 150ml/h 3時間～ 200ml/h			点滴速度	開始～ 50ml/h 1時間～ 100ml/h 2時間～ 150ml/h 3時間～ 200ml/h						
コメント等				コメント等							
	1～3時間前に前投薬あり				1～3時間前に前投薬あり						
メモ	Day1,8,15,22 ダラザレックスの投与1-3時間前にアセトアミノフェン1000mg、ボラミン2mg、モンテルカスト10mgを前投与 レブラミド25mg Day1-21 7日間休薬										