

肺がん Nivo+Ipi+CBDCA+PTX (K42 D1,22)

day(1)				day(22)				day(42)								
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			休薬完了				
薬品	デキサート(3.3) ファモチジン ネオレスタール グラニセトロン(1) 生食(50)	5 1 1 1 1	A A A A 本	薬品	オブジーボ (240) オブジーボ (120) 生食(100) 200ml/h	1 1 1	V V 本	薬品	デキサート(3.3) ファモチジン ネオレスタール グラニセトロン(1) 生食(50)	5 1 1 1 1	A A A A 本		薬品	オブジーボ (240) オブジーボ (120) 生食(100) 200ml/h	1 1 1	V V 本
点滴速度	200ml/h			点滴速度	6番目			点滴速度	200ml/h				点滴速度	6番目		
コメント等	1番目			コメント等	フィルター付キレート使用			コメント等	1番目				コメント等	フィルター付キレート使用		
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射				手技	点滴注射		
薬品	生食(50)	1	本	薬品	生食(50)	1	本	薬品	生食(50)	1	本		薬品	生食(100)	1	本
点滴速度	100ml/h			点滴速度	100ml/h			点滴速度	100ml/h				点滴速度	100ml/h		
コメント等	2番目			コメント等	7番目			コメント等	2番目				コメント等	7番目		
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射				手技	点滴注射		
薬品	バクリタキセル 生食(500)	200 1	mg/m ² 本	薬品	ヤーポイ 生食(50)	1 1	mg/kg 本	薬品	バクリタキセル 生食(500)	200 1	mg/m ² 本		薬品			
点滴速度	170ml/h			点滴速度	60ml/h			点滴速度	170ml/h				点滴速度			
コメント等	3番目			コメント等	8番目			コメント等	3番目				コメント等			
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射				手技	点滴注射		
薬品	5%ブドウ糖(250) カルボプラチン	1 6	本 AUC	薬品	生食(100) フラッシュ用	1	本	薬品	5%ブドウ糖(250) カルボプラチン	1 6	本 AUC		薬品			
点滴速度	200ml/h			点滴速度	9番目			点滴速度	200ml/h				点滴速度			
コメント等	4番目			コメント等				コメント等	4番目				コメント等			
手技	点滴注射			手技				手技	点滴注射				手技			
薬品	生食(50)	1	本	薬品				薬品	生食(50)	1	本		薬品			
点滴速度	フラッシュ用			点滴速度				点滴速度	フラッシュ用				点滴速度			
コメント等	5番目			コメント等				コメント等	5番目				コメント等			
メモ	<内服制吐剤必要> アブレピタント (day1,22) 125mg (day2,3,23,24) 80mg 状況によりデカドロン4mg 分2 (day2-4,22-25) 追加 *CBDCAのAUC6→忍容性がある患者が確認。なければAUC5以下へ疑義 *Ipilimumabの濃度: 1-4mg/mlを確認 (調製後の全量を30mlにする) *化学療法併用は1kurのみ。2kur目からはNivo + Ipiへ															