

肺がん Nivo+Ipi+CBDCA+Peme (K42D1,22)

day(1)				day(22)				day(42)									
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射								
薬品	グラニセトロン(1)	1	A	薬品	生食(50)	1	本	薬品	グラニセトロン(1)	1	A						
	デキサート(3.3)	1	A							薬品	生食(100)	1	本				
	デキサート(1.65)	1	A														
	生食(100)	1	本														
点滴速度	200ml/h			点滴速度	100ml/h			点滴速度	200ml/h								
コメント等	1番目			コメント等	6番目			コメント等	1番目								
手技	点滴注射			手技	フラッシュ用			コメント等	フラッシュ用								
薬品	生食(100)	1	本	薬品	点滴注射			薬品	生食(100)	1	本						
	ベムトレキサド	500	mg/m ²							薬品	ベムトレキサド	500	mg/m ²				
点滴速度	500ml/h			点滴速度	60ml/h			点滴速度	500ml/h								
コメント等	2番目			コメント等	7番目			コメント等	2番目								
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射								
薬品	5%ブドウ糖(250)	1	本	薬品	生食(100)	1	本	薬品	5%ブドウ糖(250)	1	本						
	カルボプラチン	5~6	AUC							薬品	カルボプラチン	5~6	AUC				
点滴速度	200ml/h			点滴速度	フラッシュ用			点滴速度	200ml/h								
コメント等	3番目			コメント等	8番目			コメント等	3番目								
手技	点滴注射				手技	点滴注射			手技	点滴注射							
薬品	生食(50)	1	本		薬品	生食(50)	1		本	薬品	生食(50)	1	本				
点滴速度	フラッシュ用				点滴速度	フラッシュ用				点滴速度	フラッシュ用						
コメント等	4番目				コメント等	4番目				コメント等	4番目						
手技	点滴注射				薬品	点滴注射				薬品	点滴注射						
薬品	オブジーボ(240)	1	V			薬品	オブジーボ(240)		1		V	薬品	オブジーボ(240)	1	V		
	オブジーボ(120)	1	V											薬品	オブジーボ(120)	1	V
	生食(100)	1	本												薬品	生食(100)	1
点滴速度	200ml/h				点滴速度	200ml/h				点滴速度	200ml/h						
コメント等	5番目				コメント等	5番目				コメント等	5番目						
	フィルター付きルート使用					フィルター付きルート使用					フィルター付きルート使用						
メモ	＜投与必要＞ パンビタン末1g分1経口（初回投与の7日以上前～最終投与後22日まで） メチコバル注1.000μg筋注（初回投与7日前および3kurごと） ＜内服制吐剤必要＞ アプレピタント（day1,22）125mg（day2,3,23,24）80mg 状況によりデカドロン4mg 分2（day2-4,22-25）追加 *CBDCAのAUC6の場合→忍容性がある患者が確認。なければAUC5以下へ疑義 *Ipilimumabの濃度:1-4mg/mlを確認（調製後の全量を30mlにする） *化学療法併用は1kurのみ。2kur目からはNivo+Ipiへ																