

悪性リンパ腫 Pola-B-R (1kur目) (K21D1,2,3)

day(1)				day(2)				day(3)				day(21)			
手技	点滴静注			手技	点滴静注			手技	点滴静注			休薬完了			
薬品	生食 (500)	1	本	薬品	生食 (500)	1	本	薬品	生食 (250)	1	本				
点滴速度	60ml/h			点滴速度	60ml/h			点滴速度	60ml/h						
コメント等	1番目			コメント等	1番目			コメント等	1番目						
手技	点滴静注			手技	点滴静注			手技	点滴静注						
薬品	リツキシマブ 生食 (500) (前投薬あり)	375	mg/m ²	薬品	グラニセロンバッグ デキサート (3.3)	1 3	本 A	薬品	グラニセロンバッグ デキサート (3.3)	1 2	本 A				
点滴速度	~ 1 時間50ml/h 1 ~ 2 時間100ml/h 2 時間~200ml/h			点滴速度	200ml/h 開始30分後ポライビ-前投薬服用			点滴速度	200ml/h						
コメント等	2番目			コメント等	2番目			コメント等	2番目						
				手技	点滴静注			手技	点滴静注						
				薬品	ベンダムスチン 生食 (50)	90 1	mg/m ² 本	薬品	ベンダムスチン 生食 (50)	90 1	mg/m ² 本				
				点滴速度	300ml/h			点滴速度	300ml/h						
				コメント等	3番目			コメント等	3番目						
				手技	点滴静注										
				薬品	ポライビ- 蒸留水 (20) (溶解用) 生食 (100) (前投薬あり)	1.8 1 1	mg/kg V 袋								
				点滴速度	90分かけて投与										
				コメント等	フィルター付きルート使用 / 投与後30分経過 4番目										
(d1,2) 前投薬 : アセトアミノフェン500mg、ポラミン2mg、アタラックスP25mg アプレピタント (d2 125mg d3,4 80mg)															