

肺がん Nivo+Ipi+CBDCA+Peme (K42D1,22)

day(1)					day(22)					day(42)									
手技	点滴注射				手技	点滴注射				手技	点滴注射								
薬品	グラニセトロン(1)	1	A		薬品	生食(50)	1	本		薬品	グラニセトロン(1)	1	A		薬品	生食(100)	1	本	
	デキサート(3.3)	1	A																
	デキサート(1.65)	1	A																
	アロカリス	1	A																
	生食(100)	1	本																
点滴速度	200ml/h				点滴速度	100ml/h			点滴速度	200ml/h			点滴速度	フラッシュ用					
コメント等	1番目				コメント等	6番目 フラッシュ用			コメント等	1番目			コメント等	6番目					
手技	点滴注射				手技	点滴注射			手技	点滴注射			休薬完了						
薬品	生食(100)	1	本		薬品	ヤーボイ	1	mg/kg		薬品	生食(100)	1						本	
	ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>								ペムトレキセド	500						mg/m <sup>2</sup>	
点滴速度	500ml/h				点滴速度	60ml/h			点滴速度	500ml/h									
コメント等	2番目				コメント等	7番目			コメント等	2番目									
手技	点滴注射				手技	点滴注射			手技	点滴注射									
薬品	5%ブドウ糖(250)	1	本		薬品	生食(100)	1	本		薬品	5%ブドウ糖(250)	1						本	
	カルボプラチン	5~6	AUC								カルボプラチン	5~6						AUC	
点滴速度	200ml/h				点滴速度	フラッシュ用			点滴速度	200ml/h									
コメント等	3番目				コメント等	8番目			コメント等	3番目									
手技	点滴注射					手技	点滴注射			手技	点滴注射								
薬品	生食(50)	1	本			薬品	生食(50)	1	本		薬品	生食(50)						1	本
点滴速度	フラッシュ用					点滴速度	フラッシュ用			点滴速度	フラッシュ用								
コメント等	4番目					コメント等	4番目			コメント等	4番目								
手技	点滴注射					手技	点滴注射			手技	点滴注射								
薬品	オブジーボ(240)	1	V			薬品	オブジーボ(240)	1	V		薬品	オブジーボ(240)						1	V
	オブジーボ(120)	1	V																
	生食(100)	1	本																
点滴速度	200ml/h				点滴速度	200ml/h			点滴速度	200ml/h									
コメント等	5番目				コメント等	5番目			コメント等	5番目									

<投与必要>  
 パンピタン末1g分1経口(初回投与の7日以上前~最終投与後22日まで)   メチコパル注1.000μg筋注(初回投与7日前および3kurごと)  
 <内服制吐剤> 状況によりデカドロン4mg分2(day2-4,22-25)追加  
 \*化学療法併用は1kurのみ。2kur目からはNivo+Ipiへ