

肺がん Pemetrexed+ BV (K21D1)

| day(1) | | | | day(21) | | | |
|--|-------------|-----|-------------------|---------|--|--|--|
| 手技 | 点滴注射 | | | 休薬完了 | | | |
| 薬品 | デキサート (3.3) | 2 | A | | | | |
| | 生食 (100) | 1 | 本 | | | | |
| 点滴速度 | 200ml/h | | | | | | |
| コメント等 | 1番目 | | | | | | |
| 手技 | 点滴注射 | | | | | | |
| 薬品 | 生食 (100) | 1 | 本 | | | | |
| | アリムタ | 500 | mg/m ² | | | | |
| 点滴速度 | 500ml/h | | | | | | |
| コメント等 | 2番目 | | | | | | |
| 手技 | 点滴注射 | | | | | | |
| 薬品 | ヘバシズマブ | 15 | mg/kg | | | | |
| | 生食 (100) | 1 | 本 | | | | |
| 点滴速度 | 100ml/h | | | | | | |
| コメント等 | 3番目 | | | | | | |
| 手技 | 点滴注射 | | | | | | |
| 薬品 | 生食 (100) | 1 | 本 | | | | |
| 点滴速度 | | | | | | | |
| コメント等 | 4番目 | | | | | | |
| <p><投与必要> パンビタン末1g分1経口 (初回投与の7日以上前～最終投与後22日まで) メチコバル注1000μg筋注 (初回投与7日前および3kurごと)</p> | | | | | | | |