
4. 糖尿病·代謝内科


2018年6-8月 DM薬剤調べ 患者実数1,837名


2018年6-8月糖尿病薬






SU薬645名使用状況









持効型インスリン 296名 レベミル注 イノレット レベミル注 フレックスペン (3mL) トレシーバー注 フレックスタッチ (3mL) インスリングラルギンBS注 ミリオン ペン「リリー」 ランタスXR (1.5mL) ランタス注 ソロスター (3mL) 0 100 120 20 40 60 80 (人)

持効型インスリンの他の注射薬との併用割合





2018年10月~12月糖尿病外来統計


2018年10月~12月糖尿病外来患者1,314名 里性:784名

男性:784名1型糖尿病93名女性:530名2型糖尿病1,209名その他12名

除外


救急受診、2018年7月以降の初診患者(3ヶ月以内の患者)、他科入院患者





平均:66.62±13.64歳 男性:66.68±12.92歳 女性:66.54±13.09歳

平均BMI: 24.9±4.39kg/㎡ 男性: 24.78±3.85kg/㎡ 女性: 25.07±4.98kg/㎡



4% 2% ■ 6%未満 6~6.9% ■ 7~7.9% ■ 8~8.9% ■ 9~9.9%

HbA1c

平均HbA1c: 7.1±1.12% 7%未:全体の53%

高血圧症 938名 (71%) 脂質異常症 237名 (18%) 腎障害あり 少なくとも675名 (52%)

透析予防指導

自己注射指導料

随時コレステロール 1,250名 177.7 ± 60.4 mg/d1TG 1,250名 158.1 ± 116.5 mg/d1HDL-C 54.6 ± 34.65 mg/d11,241名 LDL-C 1,230名 92.3 \pm 40.3 mg/d1実人数 糖尿病看護 171名 フットケア 21名

123名

523名

- 10%以上