

乳がん Pembrolizumab+CBDCA+GEM (K21D1,8)

day(1)								day(8)				day(21)
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			休薬完了
薬品	生食（50）	1	本	薬品	生食（100）	1	本	薬品	グラニセトロン（1）	1	A	
					ゲムシタビン	1	g/m ²		デキサート（3.3）	1	A	
									デキサート（1.65）	1	A	
									生食（100）	1	本	
点滴速度				点滴速度	200ml/h			点滴速度				
コメント等				コメント等				コメント等	200ml/h			
1番目				5番目				1番目				
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			
薬品	生食（100）	1	本	薬品	ブドウ糖（250）	1	本	薬品	生食（100）	1	本	
	キイトルーダ	200	mg/body		カルボプラチン	2	AUC		ゲムシタビン	1	g/m ²	
点滴速度	200ml/h			点滴速度	200ml/h			点滴速度	200ml/h			
コメント等	フィルター付きルート使用			コメント等				コメント等				
2番目				6番目				2番目				
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			
薬品	生食（50）	1	本	薬品	生食（100）	1	本	薬品	ブドウ糖（250）	1	本	
									カルボプラチン	2	AUC	
点滴速度				点滴速度				点滴速度	200ml/h			
コメント等	フラッシュ用			コメント等	フラッシュ用			コメント等				
3番目				7番目				3番目				
手技	点滴注射							手技	点滴注射			
薬品	グラニセトロン（1）	1	A					薬品	生食（100）	1	本	
	デキサート（3.3）	1	A									
	デキサート（1.65）	1	A									
	生食（100）	1	本									
点滴速度	200ml/h							点滴速度	フラッシュ用			
コメント等								コメント等				
4番目								4番目				

- CBDCAはAUC2のため、制吐剤（アブレピタント）の投与は慎重に判断
- ただしDEXはアブレピタント併用時の用量のため状況により増量も考慮
- オプション：デカドロン4mg分2（day2-4）追加
- CPS≥10
- CBDCAの投与回数の制限はなし。開始後はPembro単独やPem + GEMへの変更も可