

**大腸がん XELIRI (XELODA+CPT-11) +BV (K21D1) (Pod1-14)**

| day(1) |              |     |                   | day(21) |  |  |  |
|--------|--------------|-----|-------------------|---------|--|--|--|
| 手技     | 点滴注射         |     |                   | 休薬完了    |  |  |  |
| 薬品     | グラニセトロン（1）   | 1   | A                 |         |  |  |  |
|        | デキサート（3.3）   | 1   | A                 |         |  |  |  |
|        | デキサート（1.65）  | 1   | A                 |         |  |  |  |
|        | アロカリス        | 1   | 本                 |         |  |  |  |
|        | 生食（100）      | 1   | 本                 |         |  |  |  |
| 点滴速度   | 200ml/h      |     |                   |         |  |  |  |
| コメント等  | 1番目          |     |                   |         |  |  |  |
|        |              |     |                   |         |  |  |  |
| 手技     | 点滴注射         |     |                   |         |  |  |  |
| 薬品     | ベバシズマブ       | 7.5 | mg/kg             |         |  |  |  |
|        | 生食（100）      | 1   | 本                 |         |  |  |  |
|        |              |     |                   |         |  |  |  |
|        |              |     |                   |         |  |  |  |
| 点滴速度   | 67ml/h       |     |                   |         |  |  |  |
| コメント等  | 2番目          |     |                   |         |  |  |  |
|        |              |     |                   |         |  |  |  |
| 手技     | 点滴注射         |     |                   |         |  |  |  |
| 薬品     | イリノテカン       | 200 | mg/m <sup>2</sup> |         |  |  |  |
|        | 5 %ブドウ糖（500） | 1   | 本                 |         |  |  |  |
|        |              |     |                   |         |  |  |  |
|        |              |     |                   |         |  |  |  |
| 点滴速度   | 350ml/h      |     |                   |         |  |  |  |
| コメント等  | 3番目          |     |                   |         |  |  |  |
|        |              |     |                   |         |  |  |  |
| 手技     | 点滴注射         |     |                   |         |  |  |  |
| 薬品     | 生食（100）      | 1   | 本                 |         |  |  |  |
|        |              |     |                   |         |  |  |  |
|        |              |     |                   |         |  |  |  |
|        |              |     |                   |         |  |  |  |
| 点滴速度   |              |     |                   |         |  |  |  |
| コメント等  | 4番目          |     |                   |         |  |  |  |
|        |              |     |                   |         |  |  |  |

<内服制吐剤>

状況によりデカドロン4mg分2(day2-4)追加

<併用抗がん薬>

カペシタビン 800mg/m<sup>2</sup>/回（day1夕-day15朝）内服(day15-21）休薬