

食道がん FP (800/80) +Pembrolizumab (K21D1,2-5)

day(1) メインルート				day(1) 側管				day(2-3)				day(4)				day(5)							
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射						
薬品	生食 (50)	1	本	薬品	生食 (500)	1	本	薬品	ソルデム3A (500)	1	本	薬品	フルオロウラシル	800	mg/m2	薬品	フルオロウラシル	800	mg/m2	薬品	フルオロウラシル	800	mg/m2
					硫酸Mg補正液	8	ml						生食 (1000)	1	本		生食 (1000)	1	本		生食 (1000)	1	本
点滴速度				点滴速度	500ml/h			点滴速度	250ml/h			点滴速度	45~55ml/hで調整可			点滴速度	45~55ml/hで調整可			点滴速度	45~55ml/hで調整可		
コメント等	メインルート1番目			コメント等	側管1番目			コメント等	側管6,7番目			コメント等	メインルート 側管あり			コメント等	メインルート 側管あり			コメント等	メインルート		
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射						
薬品	キイトルーダ (200)	1	本	薬品	ソルデム3A (500)	1	本	薬品	デキサート (3.3)	2	A	薬品	デキサート (3.3)	2	A	薬品	デキサート (3.3)	2	A	薬品	生食 (100)	1	本
	生食 (100)	1	本						デキサート (1.65)	1	A		デキサート (1.65)	1	A		生食 (100)	1	本				
									生食 (100)	1	本		生食 (100)	1	本								
点滴速度	200ml/h			点滴速度	500ml/h			点滴速度	200ml/h			点滴速度	200ml/h			点滴速度	フラッシュ用			点滴速度	フラッシュ用		
コメント等	メインルート2番目			コメント等	側管2番目			コメント等	側管1番目			コメント等	側管			コメント等				コメント等			
	フィルター付きルート使用																						
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射		
薬品	生食 (50)	1	本	薬品	パロノセトロン	1	V	薬品	ソルデム3A (500)	1	本	薬品	ソルデム3A (500)	1	本	薬品	パロノセトロン	1	V	薬品	デキサート (3.3)	3	A
					デキサート (3.3)	3	A										アロカリス	1	A		生食 (100)	1	本
					生食 (100)	1	本										生食 (100)	1	本				
点滴速度	メインルート3番目			点滴速度	200ml/h			点滴速度	250ml/h			点滴速度	250ml/h			点滴速度	250ml/h			点滴速度	250ml/h		
コメント等	フラッシュ用			コメント等	側管3番目			コメント等	側管2,3番目			コメント等	側管2,3番目			コメント等	側管2,3番目			コメント等	側管2,3番目		
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射		
薬品	フルオロウラシル	800	mg/m2	薬品	マンニトール	1	本	薬品	マンニトール	1	本	薬品	マンニトール	1	本	薬品	マンニトール	1	本	薬品	マンニトール	1	本
	生食 (1000)	1	本																				
点滴速度	45~55ml/hで調整可			点滴速度	500ml/h			点滴速度	500ml/h			点滴速度	500ml/h			点滴速度	500ml/h			点滴速度	500ml/h		
コメント等	メインルート4番目			コメント等	側管4番目			コメント等	側管4番目			コメント等	側管4番目			コメント等	側管4番目			コメント等	側管4番目		
				手技	点滴注射																		
				薬品	シスプラチン	80	mg/m2																
					生食 (500)	1	本																
				点滴速度	250ml/h																		
				コメント等	側管5番目																		

day(21)

休薬完了

<内服制吐剤必要>

* CDDPIは6kurまで, 5FuとPembrolizumabでmaintenance

* 5FuとPembrolizumabのみになった際には制吐療法の変更を (制吐療法なしで実施も可)