

# 食道がん Nivolumab+Ipilimumab (K42D1,22)

day(1)				day(22)				day(42)			
手技	点滴注射			手技	点滴注射			休薬完了			
薬品	生食(50)	1	本	薬品	生食(50)	1	本				
点滴速度	200ml/h			点滴速度	200ml/h						
コメント等	1番目			コメント等	1番目						
手技	点滴注射			手技	点滴注射						
薬品	オブジーボ (240)	1	V	薬品	オブジーボ (240)	1	V				
	オブジーボ (120)	1	V		オブジーボ (120)	1	V				
	生食(100)	1	本		生食(100)	1	本				
点滴速度	200ml/h			点滴速度	200ml/h						
コメント等	2番目 フィルター付きルート使用			コメント等	2番目 フィルター付きルート使用						
手技	点滴注射			手技	点滴注射						
薬品	生食(50)	1	本	薬品	生食(100)	1	本				
点滴速度	100ml/h			点滴速度							
コメント等	3番目			コメント等	3番目 フラッシュ用						
手技	点滴注射										
薬品	ヤーボイ	1	mg/kg								
	生食(50)	1	本								
点滴速度	60ml/h										
コメント等	4番目										
手技	点滴注射										
薬品	生食(100)	1	本								
点滴速度											
コメント等	5番目 フラッシュ用										

\*PD-L1発現率が1%未満(TPS<1%)の患者は本剤以外の治療選択も考慮。