

悪性リンパ腫 B-G初回 (K28D1,2,8,15)

day(1)				day(2)				day(8,15)				day(28)	
手技	点滴静注			手技	点滴静注			手技	点滴静注			休薬完了	
薬品	生食(500)	1	本	薬品	生食(500)	1	本	薬品	生食(500)	1	本		
点滴速度	60ml/h			点滴速度	60ml/h			点滴速度	60ml/h				
コメント等	1番目			コメント等	1番目			コメント等	1番目				
手技	点滴静注			手技	点滴静注			手技					
薬品	グラニセロンバッグ	1	本	薬品	グラニセロンバッグ	1	本	薬品					
	デキサート(3.3)	5	A		デキサート(3.3)	2	A						
点滴速度	200m l / h			点滴速度	200m l / h			点滴速度					
コメント等	2番目			コメント等	2番目			コメント等					
手技	点滴静注			手技	点滴静注			手技	点滴静注				
薬品	トレアキシシ	90	mg / m ²	薬品	トレアキシシ	90	mg / m ²	薬品	ガザイバ	1000	mg/body		
	蒸留水(100) * 溶解用	1	V		蒸留水(100) * 溶解用	1	V		生食(250)	1	本		
	生食(250)	1	本		生食(250)	1	本						
	(投与30分後ガザイバ前投薬服用)								開始30分前に前投薬あり				
点滴速度	250m l / h			点滴速度	250m l / h			点滴速度	～30分 25ml/h				
コメント等	3番目			コメント等	3番目				30分～1時間 50ml/h				
									1～1.5時間 75ml/h				
									1.5時間以降 最大100ml/hまで可				
手技	点滴静注							コメント等					
薬品	ガザイバ	1000	mg/body						コメント等	2番目			
	生食(250)	1	本										
	開始30分前に前投薬あり												
点滴速度	～30分 12ml/h												
	30分～1時間 25ml/h												
	1～1.5時間 37ml/h												
	1.5～2時間 50ml/h												
	2～2.5時間 62ml/h												
	2.5～3時間 75ml/h												
	3～3.5時間 87ml/h												
	3.5時間以降 最大100ml/hまで可												
コメント等	4番目												

ガザイバ投与30分前 アタラックスP25mg、ポララミン2mg、アセトアミノフェン1000mgの前投与あり