

悪性リンパ腫 B-G (K28D1,2)

day(1)				day(2)				day(28)			
手技	点滴静注			手技	点滴静注			休薬完了			
薬品	生食(500)	1	本	薬品	生食(500)	1	本				
点滴速度	60ml/h			点滴速度	60ml/h						
コメント等	1番目			コメント等	1番目						
手技	点滴静注			手技	点滴静注						
薬品	グラニセロンバッグ(3)	1	本	薬品	グラニセロンバッグ(3)	1	本				
	デキサート(3.3)	2	A		デキサート(3.3)	2	A				
点滴速度	200ml/h			点滴速度	200ml/h						
コメント等	2番目			コメント等	2番目						
手技	点滴静注			手技	点滴静注						
薬品	トレアキシシ	90	mg/m ²	薬品	トレアキシシ	90	mg/m ²				
	蒸留水(100) * 溶解用	1	V		蒸留水(100) * 溶解用	1	V				
	生食(250)	1	本		生食(250)	1	本				
	(投与30分後ガザイバ前投薬服用)										
点滴速度	250ml/h			点滴速度	250ml/h						
コメント等	3番目			コメント等	3番目						
手技	点滴静注										
薬品	ガザイバ	1000	mg/body								
	生食(250)	1	本								
開始30分前に前投薬あり											
点滴速度	~30分	25ml/h									
	30分~1時間	50ml/h									
	1~1.5時間	75ml/h									
1.5時間以降 最大100ml/hまで可											
コメント等	4番目										

ガザイバ投与30分前 アタラックスP25mg、ポラミン2mg、アセトアミノフェン1000mgの前投与あり