

悪性リンパ腫 Pola-B-R (K2~) (K21D1,2)

day(1)					day(2)					day(21)		
手技	点滴静注			手技	点滴静注			手技	点滴静注			
薬品	生食（500）	1	本	薬品	リツキシマブ	375	mg/m ²	薬品	生食（250）	1	本	
					生食（500）							
					（前投薬あり）							
点滴速度	60ml/h			点滴速度	～ 1 時間50ml/h 1 ～ 2 時間100ml/h		点滴速度	60ml/h				
コメント等				コメント等	2 時間～200ml/h		コメント等					
	1番目				6番目				1番目			
手技	点滴静注				手技	点滴静注		手技	点滴静注			
薬品	グラニセトロンバッグ	1	本		薬品	グラニセトロンバッグ			薬品	グラニセトロンバッグ	1	本
	デキサート（3.3）	3	A			デキサート（3.3）				デキサート（3.3）	2	A
点滴速度	200m l / h				点滴速度	200m l / h			点滴速度	200m l / h		
コメント等	開始30分後ポライビ-前投薬服用				コメント等	2番目			コメント等	2番目		
手技	点滴静注				手技	点滴静注			手技	点滴静注		
薬品	トレアキシシ	90	mg/m ²		薬品	ベンダムスチン	90	mg/m ²	薬品	ベンダムスチン	90	mg/m ²
	生食（50）	1	本			生食（50）	1	本		生食（50）	1	本
点滴速度	300m l / h				点滴速度	300m l / h			点滴速度	300m l / h		
コメント等					コメント等	3番目			コメント等	3番目		
手技	点滴静注											
薬品	ポライビ-	1.8	mg/kg									
	蒸留水（20）（溶解用）	1	V									
	生食（100）	1	袋									
	（前投薬あり）											
点滴速度	100ml/h 忍容性あれば3回目以降30分まで短縮可											
コメント等	フィルター付きルート使用											
	4番目											
手技	点滴静注											
薬品	生食（100）	1	本									
点滴速度	200ml/h											
コメント等	Pola投与後30分経過観察											
	5番目											
前投薬（d1）：アセトアミノフェン500mg、ボララミン2mg、アタラックスP25mg アプレビタント（d1 125mg d2,3 80mg）												