

# 悪性リンパ腫 Pola-R-CHP (2days) (K21D1,2)

day(1)				day(2)				day(21)				
手技	点滴静注			手技	点滴注射			手技	点滴注射			休薬完了
薬品	生食 (500)	1	本	薬品	生食 (500)	1	本	薬品	エンドキサン	750	mg/m2	
									生食 (500)	1	本	
点滴速度	60ml/h			点滴速度	40ml/h			点滴速度	250ml/h			
コメント等	1番目			コメント等	メインルート 1番目			コメント等	6番目			
手技	点滴静注			手技	点滴注射							
薬品	リツキシマブ	375	mg/m <sup>2</sup>	薬品	グラセトロンバッグ	1	V					
	生食 (500)											
	(前投薬あり)											
点滴速度	～1時間50ml/h 1～2時間100ml/h 2時間～200ml/h			点滴速度	200ml/h							
コメント等				コメント等	2番目							
コメント等	2番目			手技	点滴注射							
				薬品	ポライビー	1.8	mg/kg					
					蒸留水 (20)	1	A					
					生食 (100)	1	本					
				点滴速度	90分かけて投与							
				コメント等	フィルター付きルート使用 3番目							
				手技	点滴注射							
				薬品	生食 (100)	1	本					
				点滴速度	200ml/h							
				コメント等	ポライビー投与終了後30分 経過観察 4番目							
				手技	点滴注射							
				薬品	アドリアシン	50	mg/m2					
					生食 (100)	1	本					
				点滴速度	200ml/h							
				コメント等	5番目							
Day1のリツキシマブ投与の30分前に、アセトアミノフェン500mg、ポララミン2mg、アタラックスP25mg Day2のポライビー投与の30～60分前に、アセトアミノフェン500mg、ポララミン2mg、アタラックスP25mg day(2-6) : プレドニゾン100mg/body												