

悪性リンパ腫 Pola-R-CHP (1day) (K21D1)

day(1)					day(21)		
手技	点滴注射			手技	点滴注射		
薬品	生食（500）	1	本	薬品	アドリアシン	50	mg/m2
					生食（100）	1	本
点滴速度	40ml/h			点滴速度	200ml/h		
コメント等	メインルート			コメント等			
	1番目				6番目		
手技	点滴静注			手技	点滴注射		
薬品	リツキシマブ	375	mg/m ²	薬品	エンドキサン	750	mg/m2
	生食（500）				生食（500）	1	本
	（前投薬あり）						
点滴速度	～1時間50ml/h 1～2時間100ml/h			点滴速度	250ml/h		
コメント等	2時間～200ml/h			コメント等			
	2番目				7番目		
手技	点滴注射			休薬完了			
薬品	グラニセトロンバッグ	1	V				
点滴速度	200ml/h						
コメント等	リツキシマブ投与終了後30分 経過観察						
	3番目						
手技	点滴注射						
薬品	ボライビー	1.8	mg/kg				
	蒸留水（20）	1	A				
	生食（100）	1	本				
点滴速度	忍容性があれば2回目以降30分まで短縮可						
コメント等	フィルター付きルート使用						
	4番目						
手技	点滴注射						
薬品	生食（100）	1	本				
点滴速度	200ml/h						
コメント等	ボライビー投与終了後30分 経過観察						
	5番目						
Day1のリツキシマブ投与の30分前に、アセトアミノフェン500mg、ボラミン2mg、アタラックスP25mg day(1－5)：プレドニゾロン100mg/body							