

多発性骨髄腫 EPd (1,2kur目) (K28D1,8,15,22) (Pod 1-21)

day(1,8,15,22)				day(1,8,15,22)				day(28)	
手技	点滴注射			手技	点滴注射			休薬完了	
薬品	生食(250)	1	本	薬品	生食(100)	1	本		
					デキサート(3.3)	2	A		
					ファモチジン	1	A		
					ネオレスタール	1	A		
点滴速度	20ml/h			点滴速度	200ml/h				
コメント等	メインルート			コメント等	同時にアセトアミノフェンを内服				
					側管1番目				
				手技	点滴注射				
				薬品	生食(100)	1	本		
				点滴速度	100ml/h				
				コメント等					
					側管2番目				
				手技	点滴注射				
				薬品	エムプリシティ	10	mg/kg		
					蒸留水(100ml)*溶解用	1	瓶		
					生食(250)	1	本		
				点滴速度	1kur目初回	開始~30分	30ml/h		
						30分~60分	60ml/h		
						60分以降	120ml/h		
					1kur目2回目	開始~30分	180ml/h		
					30分以降	240ml/h			
	1kur目3,4回目および2kur目以降		300ml/h						
コメント等									
	投与45-90分前に前投薬あり								
	側管3番目								

Day1,8,15,22 レナデックス28mg (エムプリシティ投与3-24時間前 75歳以上減量基準あり)

Day1,8,15,22 アセトアミノフェン300-1000mg (エムプリシティ投与45-90分前)

ポマリスト4mg/day (Day1-21 7日間休薬)