

多発性骨髄腫 EPd (3kur目以降) (K28D1) (Pod 1-21)

day(1)				day(1)				day(8,15,22)		day(28)	
手技	点滴注射			手技	点滴注射			DEX40mg内服	休薬完了		
薬品	生食(250)	1	本	薬品	生食(100)	1	本				
					デキサート(3.3)	2	A				
					ファモチジン	1	A				
					ネオレスタール	1	A				
点滴速度	20ml/h			点滴速度	200ml/h						
コメント等	メインルート			コメント等	同時にアセトアミノフェンを内服						
					側管1番目						
				手技	点滴注射						
				薬品	生食(100)	1	本				
				点滴速度	100ml/h						
				コメント等							
					側管2番目						
				手技	点滴注射						
				薬品	エムプリシティ	20	mg/kg				
					蒸留水(100ml)＊溶解用	1	瓶				
					生食(250)	1	本				
				点滴速度	3kur目	開始～30分	180ml/h				
						30分以降	240ml/h				
					4kur目以降		300m/h				
コメント等											
	投与45-90分前に前投薬あり										
	側管3番目										

Day1 レナデックス28mg(エムプリシティ投与3-24時間前 75歳以上減量基準あり)
Day1,8,15,22 アセトアミノフェン300～1000mg(エムプリシティ投与45-90分前)
ポマリスト4mg/day (Day1-21 7日間休薬)