## 多発性骨髄腫 DaraMPB(1kur目)(K42D1,4,8,11,15,22,25,29,32,36)

C	day(1,8,15,22,2	day(1)					day(8,22,29)				day(15,36)				day(4,11,25,32)				
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	皮下注射		
	生食(500) *day1のみ	1	本		生食(100)	1	本	薬品	生食(100)	1	本	- 薬品	生食(100)	1	本		ベルケイド	1.3	mg/mੈ
薬品	生食(250) *day8以降	1	本		デキサート(3.3)	5	Α		デキサート(3.3)	5	Α		デキサート(3.3)	5	Α		生食(20)	1	本
点滴速度	20ml/min			点滴速度	100ml/h			点滴速度	100ml/h			点滴速度	100ml/h			点滴速度			
コメント等				― コメント等				コメント等				- コメント等				- コメント等			
	メインルート				側管1番目				側管1番目				側管1番目						
				手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射				day(42)		
					生食(100)	1	本		生食(100)	1	本		生食(100)	1	本		uay(42)	'	
				薬品				薬品				薬品							
				***************************************				***************************************				***************************************							
				点滴速度	100ml/h			点滴速度	100ml/h			点滴速度	100ml/h						
				コメント等				・コメント等				- コメント等				1			
				コンノバ寺	側管2番目			コンノい寺	側管2番目			コンノバ寺	側管2番目						
				手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射						
				薬品	ダラザレックス	16	mg/kg	薬品	ダラザレックス	16	mg/kg	薬品	ダラザレックス	16	mg/kg	[آر			
				采加	生食(500)	2	袋	采加	生食(500)	1	袋	栄皿	生食(500)	1	袋				
				点滴速度	下記参照			点滴速度	下記参照			点滴速度	下記参照						
															/ <del>/</del> · · ·		休薬完了	•	
				コメント等				コメント等				コメント等					14000000000000000000000000000000000000		
				コメント寺				コメント寺				コメント寺				1			
					側管3番目				側管3番目				側管3番目						
				手技	皮下注射			手技	皮下注射										
					ベルケイド	1.3	mg/mً		ベルケイド	1.3	mg/mੈ	1							
				薬品	生食(20)	1	本	薬品	生食(20)	1	本								
				条而				<b>梁</b> 而				1							
				点滴速度				点滴速度				-							
				コメント等				・コメント等											

ダラザレックス:投与1-3時間前にアセトアミノフェン1000mg、ポララミン2mg、モンテルカスト10mgを前投与

投与速度: day1,8 →開始~50ml/h 1時間~100ml/h 2時間~150ml/h 3時間~200ml/h

day15以降→開始~100ml/h 1時間~150ml/h 2時間~200ml/h

内服併用薬 アルケラン9mg/m (day1-4) プレドニゾロン60mg/m (day2-4)