

多発性骨髄腫 DaraMPB (2-9kur目) (K42D1,8,22,29)

day(1,22)				day(1,22)				day(8,29)				day(42)
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	皮下注射			休薬完了
薬品	生食(250)	1	本	薬品	生食(100)	1	本	薬品	ヘルケイド	1.3	mg/m ²	
					デキサート(3.3)	5	A		生食(20)	1	本	
点滴速度	20ml/min			点滴速度	100ml/h			点滴速度				
コメント等	メインルート			コメント等	側管 1 番目			コメント等				
				手技	点滴注射							
				薬品	生食(100)	1	本					
				点滴速度	100ml/h							
				コメント等	側管 2 番目							
				手技	点滴注射							
				薬品	ダラザレックス	16	mg/kg					
					生食(500)	1	袋					
				点滴速度	下記参照							
					側管3番目							
				手技	皮下注射							
				薬品	ヘルケイド	1.3	mg/m ²					
					生食(20)	1	本					
				点滴速度								
				コメント等								

ダラザレックス：投与1-3時間前にアセトアミノフェン1000mg、ポララミン2mg、モンテルカスト10mgを前投与
 投与速度:開始～100ml/h 1時間～150ml/h 2時間～200ml/h
 内服併用薬 アルケラン9mg/m² (day1-4) プレドニゾロン60mg/m² (day2-4)