

**多発性骨髄腫    IsaPd (1kur目)    (K28D1,8,15,22)    (Pod 1-21)**

| day(1,8,15,22)           |                       |   |   | day(1,8,15,22) |                          |    |       | day(28) |  |
|--------------------------|-----------------------|---|---|----------------|--------------------------|----|-------|---------|--|
| 手技                       | 点滴注射                  |   |   | 手技             | 点滴注射                     |    |       | 休薬完了    |  |
| 薬品                       | 生食(250)               | 1 | 本 | 薬品             | 生食(100)                  | 1  | 本     |         |  |
|                          |                       |   |   |                | デキサート(3.3)               | 10 | A     |         |  |
|                          |                       |   |   |                |                          |    |       |         |  |
| 点滴速度                     | 20ml/h                |   |   | 点滴速度           | 110ml/h                  |    |       |         |  |
| コメント等                    | メインルート                |   |   | コメント等          |                          |    |       |         |  |
|                          | サークリサ投与15分～1時間前に前投薬あり |   |   |                | 側管1番目                    |    |       |         |  |
|                          |                       |   |   | 手技             | 点滴注射                     |    |       |         |  |
|                          |                       |   |   | 薬品             | 生食(250)                  | 1  | 本     |         |  |
|                          |                       |   |   |                | サークリサ                    | 10 | mg/kg |         |  |
|                          |                       |   |   |                |                          |    |       |         |  |
|                          |                       |   |   | コメント等          | 側管2番目                    |    |       |         |  |
|                          |                       |   |   |                | フィルター付きルート使用             |    |       |         |  |
|                          |                       |   |   |                | 投与開始15分～1時間前に前投薬あり       |    |       |         |  |
|                          |                       |   |   | 点滴速度           | d1                       |    |       |         |  |
|                          |                       |   |   |                | 開始～50ml/h                |    |       |         |  |
|                          |                       |   |   |                | 60分後～75ml/h              |    |       |         |  |
|                          |                       |   |   |                | 90分後～100ml/h             |    |       |         |  |
|                          |                       |   |   |                | * 80kg以下の投与速度は共通         |    |       |         |  |
|                          |                       |   |   |                | * 80kgを超える場合は投与速度を計算すること |    |       |         |  |
|                          |                       |   |   |                | d 8以降                    |    |       |         |  |
|                          |                       |   |   |                | 開始～50ml/h                |    |       |         |  |
|                          |                       |   |   |                | 60分後～100ml/h             |    |       |         |  |
|                          |                       |   |   |                | 90分後～135ml/h             |    |       |         |  |
| * 80kg以下の投与速度は共通         |                       |   |   |                |                          |    |       |         |  |
| * 80kgを超える場合は投与速度を計算すること |                       |   |   |                |                          |    |       |         |  |

Day1,8,15,22

\* サークリサ投与前15-60分前に前投薬（アセトアミノフェン1000mg ポララミン2mg ファモチジン20mg）

\*ポマリスト4mg/day (Day1-21 7日間休薬)

\*DEXは75歳以上では20mgへ減量する