

多発性骨髄腫 IsaPd (2kur目以降) (K28D1,15) (Pod 1-21)

day(1,15)				day(1,15)				day(8,22)		day(28)			
手技	点滴注射			手技	点滴注射			DEX40mg内服 * 75歳以上では20mgへ減量する		休薬完了			
薬品	生食(250)	1	本	薬品	生食(100)	1	本						
					デキサート(3.3)	10	A						
点滴速度	20ml/h			点滴速度	110ml/h								
コメント等	メインルート			コメント等									
	サークリサ投与15分～1時間前に前投薬あり				側管1番目								
				手技	点滴注射								
				薬品	生食(250)	1	本						
					サークリサ	10	mg/kg						
				コメント等	側管2番目								
					フィルター付きルート使用 投与開始15分～1時間前に前投薬あり								
				点滴速度									
					開始～50ml/h								
					60分後～100ml/h								
					90分後～135ml/h								
* 80kg以下の投与速度は共通 * 80kgを超える場合は投与速度を計算すること													

*Day1,15 サークリサ投与前15-60分前に前投薬
(アセトアミノフェン1000mg ポラミン2mg ファモチジン20mg)

*ボマリスト4mg/day (Day1-21 7日間休薬)

*DEX：75歳以上では20mgへ減量する