

多発性骨髄腫 ScDK d (2kur目) (K28D1,2,8,9,15,16,22)

day(1,8,15)				day(2,9,16)				day(22)				day(28)
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	皮下注射			休薬完了
薬品	ブドウ糖注5%(50)	1	本	薬品	ブドウ糖注5%(50)	1	本	薬品	ダラキューロ	1	本	
点滴速度				点滴速度	フラッシュ用			点滴速度	3-5分かけて			
コメント等	1,3番目(3番目はフラッシュ用)			コメント等	1,3番目(3番目はフラッシュ用)			コメント等	1番目			
手技	点滴注射			手技	点滴注射			DEX40mg内服 *ただし76歳以上は20mgに減量				
薬品	カイプロリス	56	mg/m2	薬品	カイプロリス	56	mg/m2					
	蒸留水(100)*溶解用	1	本		蒸留水(100)*溶解用	1	本					
	ブドウ糖注5%(100)	1	本		ブドウ糖注5%(100)	1	本					
点滴速度	30分で投与			点滴速度	30分で投与							
コメント等	2番目			コメント等	2番目							
手技	皮下注射											
	ダラキューロ	1	本									
薬品												
点滴速度	3-5分かけて											
コメント等	4番目											

①カイプロリス投与前
デキサメタゾン錠20mgをDay1,2,8,9,15,16に前投与
*ただし76歳以上は、デキサメタゾン錠20mgをDay1,8,15に前投与
②ダラキューロの投与1～3時間前
アセトアミノフェン1000mg、ポララミン2mg、モンテルカスト10mgを前投与