

多発性骨髄腫 ScDK d (7kur目以降) (K28D1,2,8,9,15,16,22)

day(1)				day(2,8,9,15,16)				day(22)		day(28)		
手技	点滴注射			手技	点滴注射			DEX40mg内服 *ただし76歳以上は20mgに減量		休薬完了		
薬品	ブドウ糖注5%(50)	1	本	薬品	ブドウ糖注5%(50)	1	本					
点滴速度				点滴速度								
コメント等				コメント等								
	1,3番目(3番目はフラッシュ用)				1,3番目(3番目はフラッシュ用)							
手技	点滴注射			手技	点滴注射							
薬品	カイプロリス	56	mg/m2	薬品	カイプロリス	56	mg/m2					
	蒸留水(100)*溶解用	1	本		蒸留水(100)*溶解用	1	本					
	ブドウ糖注5%(100)	1	本		ブドウ糖注5%(100)	1	本					
点滴速度	30分で投与			点滴速度	30分で投与							
コメント等				コメント等								
	2番目				2番目							
手技	皮下注射											
	ダラキューロ	1	本									
薬品												
点滴速度	3-5分かけて											
コメント等	25Gの針を付けて払出し											
	4番目											

①カイプロリス投与前
デキサメタゾン錠20mgをDay1,2,8,9,15,16に前投与
*ただし76歳以上は、デキサメタゾン錠20mgをDay1に、デキサメタゾン錠12mgをDay8,15に、デキサメタゾン錠8mgをDay9,16に前投与

②ダラキューロの投与1〜3時間前
アセトアミノフェン1000mg、ポララミン2mg、モンテルカスト10mgを前投与