多発性骨髄腫　ScDPd（3-6kur目）（K28D1,15）（POd 1-21）

<table>
<tr><th colspan="4">day(1,15)</th><th>day(8,22)</th><th>day(28)</th></tr>
<tr><td>手技</td><td>皮下注射</td><td></td><td></td><td rowspan="8">DEX40mg内服</td><td rowspan="8">休薬完了</td></tr>
<tr><td rowspan="4">薬品</td><td>ダラキューロ</td><td>1</td><td>本</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>点滴速度</td><td>3-5分かけて</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">コメント等</td><td>25Gの針を付けて払出し</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>１番目</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">Day1,15
*ダラキューロの投与1～3時間前にアセトアミノフェン1000mg、ポララミン2mg、モンテルカスト10mgを前投与
*ダラキューロの投与1～3時間以内にDEX40mgを内服
Day8,22
*DEX40mg/dを内服
*POM:1日1回4mg　Day1-21　7日間休薬</td></tr>
</table>