多発性骨髄腫　IsaKd　1kur目（K28D1,2,8,9,15,16,22）

day(1)			
手技	点滴注射		
薬品	生食（250）	1	本
点滴速度	1番目：20ml/h　2番目：125ml/h		
コメント等			
	メインルート１,2番目（2番目は1番目の続き）		
手技	点滴注射		
薬品	生食(100)	1	本
	デキサート(3.3)	5	A
点滴速度	100ml/h		
コメント等			
	側管1番目		
手技	点滴注射		
薬品	生食(250)	1	本
	サークリサ	10	mg/kg
点滴速度	下記		
コメント等	投与開始15分～1時間前に前投薬あり		
	側管2番目		
手技	点滴注射		
薬品	5%ブドウ糖注（50）	1	本
点滴速度	フラッシュ用　メインルート止める		
コメント等			
	側管3,5番目		
手技	点滴注射		
薬品	カイプロリス	20	mg/m2
	蒸留水(100ml)＊溶解用	1	瓶
	5%ブドウ糖注（100）	1	瓶
点滴速度	30分で投与		
コメント等			
	側管4 番目		

day(2)			
手技	点滴注射		
薬品	生食（250）	1	本
点滴速度	1番目：20ml/h　2番目：125ml/h		
コメント等			
	メインルート１,2番目（2番目は1番目の続き）		
手技	点滴注射		
薬品	5%ブドウ糖注（50）	1	本
点滴速度	フラッシュ用　メインルート止める		
コメント等			
	側管1,3番目		
手技	点滴注射		
薬品	カイプロリス	20	mg/m2
	蒸留水(100ml)＊溶解用	1	瓶
	5%ブドウ糖注（100）	1	瓶
点滴速度	30分で投与		
コメント等			
	側管2番目		

day(8,15)			
手技	点滴注射		
薬品	生食（250）	1	本
点滴速度	1番目：20ml/h　2番目：125ml/h		
コメント等			
	メインルート１,2番目（2番目は1番目の続き）		
手技	点滴注射		
薬品	生食(100)	1	本
	デキサート(3.3)	5	A
点滴速度	100ml/h		
コメント等			
	側管1番目		
手技	点滴注射		
薬品	生食(250)	1	本
	サークリサ	10	mg/kg
点滴速度	下記		
コメント等	投与開始15分～1時間前に前投薬あり		
	側管2番目		
手技	点滴注射		
薬品	5%ブドウ糖注（50）	1	本
点滴速度	フラッシュ用　メインルート止める		
コメント等			
	側管3,5番目		
手技	点滴注射		
薬品	カイプロリス	56	mg/m2
	蒸留水(100ml)＊溶解用	1	瓶
	5%ブドウ糖注（100）	1	瓶
点滴速度	30分で投与		
コメント等			
	側管4番目		

day(9,16)			
手技	点滴注射		
薬品	生食（250）	1	本
点滴速度	1番目：20ml/h　2番目：125ml/h		
コメント等			
	メインルート１,2番目（2番目は1番目の続き）		
手技	点滴注射		
薬品	5%ブドウ糖注（50）	1	本
点滴速度	フラッシュ用		
コメント等			
	側管1,3番目		
手技	点滴注射		
薬品	カイプロリス	56	mg/m2
	蒸留水(100ml)＊溶解用	1	瓶
	5%ブドウ糖注（100）	1	瓶
点滴速度	30分で投与		
コメント等			
	側管2番目		

day(22)			
手技	点滴注射		
薬品	生食（250）	1	本
点滴速度	20ml/h		
コメント等			
	メインルート		
手技	点滴注射		
薬品	生食(100)	1	本
	デキサート(3.3)	5	A
点滴速度	100ml/h		
コメント等			
	側管1番目		
手技	点滴注射		
薬品	生食(250)	1	本
	サークリサ	10	mg/kg
点滴速度	下記		
コメント等	投与開始15分～1時間前に前投薬あり		
	側管2番目		

day(23)
DEX20mg内服

day(28)
休薬完了

・day1,2,8,9,15,16のメインルート1番目の生食（250）：TLSのリスクなければサークリサ終了時に残破棄、2番目も省略可

・サークリサ

①フィルター付きルート使用

②投与速度：初回→開始～50ml/h→60分後～75ml/h→90分後～100ml/h（体重≧80kgの時は投与速度確認）

2回目以降→開始～50ml/h→60分後～100ml/h→90分後～135ml/h（体重≧80kgの時は投与速度確認）

③前投薬：投与の15分～1時間前に、アセトアミノフェン1000mg、ポララミン2mg、ファモチジン20mgを服用

・カイプロリス

①投与前にDEX20mgを内服（Day2,9,16）

②生食の側管禁止