

**多発性骨髄腫** IsaK d 2kur目以降 (K28D1,2,8,9,15,16)

| day(1,15) |                    |    |       | day(2,8,9,16) |                |    |       | day(22,23) |      | day(28) |  |
|-----------|--------------------|----|-------|---------------|----------------|----|-------|------------|------|---------|--|
| 手技        | 点滴注射               |    |       | 手技            | 点滴注射           |    |       | DEX20mg内服  | 休薬完了 |         |  |
| 薬品        | 生食（250）            | 1  | 本     | 薬品            | 5%ブドウ糖注（50）    | 1  | 本     |            |      |         |  |
|           |                    |    |       |               |                |    |       |            |      |         |  |
| 点滴速度      | 1番目：20ml/h         |    |       | 点滴速度          | ルート確保用         |    |       |            |      |         |  |
| コメント等     |                    |    |       | コメント等         |                |    |       |            |      |         |  |
|           | メインルート             |    |       |               | 1 番目           |    |       |            |      |         |  |
| 手技        | 点滴注射               |    |       | 手技            | 点滴注射           |    |       |            |      |         |  |
| 薬品        | 生食(100)            | 1  | 本     | 薬品            | カイプロリス         | 56 | mg/m2 |            |      |         |  |
|           | デキサート(3.3)         | 5  | A     |               | 蒸留水(100ml)＊溶解用 | 1  | 瓶     |            |      |         |  |
|           |                    |    |       |               | 5%ブドウ糖注（100）   | 1  | 瓶     |            |      |         |  |
|           |                    |    |       |               |                |    |       |            |      |         |  |
| 点滴速度      | 100ml/h            |    |       | 点滴速度          | 30分で投与         |    |       |            |      |         |  |
| コメント等     |                    |    |       | コメント等         |                |    |       |            |      |         |  |
|           | 側管1番目              |    |       |               | 2番目            |    |       |            |      |         |  |
| 手技        | 点滴注射               |    |       | 手技            | 点滴注射           |    |       |            |      |         |  |
| 薬品        | 生食(250)            | 1  | 本     | 薬品            | 5%ブドウ糖注（50）    | 1  | 本     |            |      |         |  |
|           | サークリサ              | 10 | mg/kg |               |                |    |       |            |      |         |  |
|           |                    |    |       |               |                |    |       |            |      |         |  |
| 点滴速度      | 下記                 |    |       | 点滴速度          | フラッシュ用         |    |       |            |      |         |  |
| コメント等     | 投与開始15分～1時間前に前投薬あり |    |       | コメント等         |                |    |       |            |      |         |  |
|           | 側管2番目              |    |       |               | 3番目            |    |       |            |      |         |  |
| 手技        | 点滴注射               |    |       |               |                |    |       |            |      |         |  |
| 薬品        | 5%ブドウ糖注（50）        | 1  | 本     |               |                |    |       |            |      |         |  |
|           |                    |    |       |               |                |    |       |            |      |         |  |
| 点滴速度      | フラッシュ用 メインルート止める   |    |       |               |                |    |       |            |      |         |  |
| コメント等     |                    |    |       |               |                |    |       |            |      |         |  |
|           | 側管3,5番目            |    |       |               |                |    |       |            |      |         |  |
| 手技        | 点滴注射               |    |       |               |                |    |       |            |      |         |  |
| 薬品        | カイプロリス             | 56 | mg/m2 |               |                |    |       |            |      |         |  |
|           | 蒸留水(100ml)＊溶解用     | 1  | 瓶     |               |                |    |       |            |      |         |  |
|           | 5%ブドウ糖注（100）       | 1  | 瓶     |               |                |    |       |            |      |         |  |
|           |                    |    |       |               |                |    |       |            |      |         |  |
| 点滴速度      | 30分で投与             |    |       |               |                |    |       |            |      |         |  |
| コメント等     |                    |    |       |               |                |    |       |            |      |         |  |
|           | 側管4番目              |    |       |               |                |    |       |            |      |         |  |

・day1

・サークリサ

①フィルター付きルート使用

②投与速度：開始～50ml/h→60分後～100ml/h→90分後～135ml/h（体重≥80kgの時は投与速度確認）

③前投薬：投与の15分～1時間前に、アセトアミノフェン1000mg、ポララミン2mg、ファモチジン20mgを服用

・カイプロリス

①投与前にDEX20mgを内服（Day2,8,9,16）

②生食側管禁止