

多発性骨髄腫 ELd (1,2kur目) (K28D1,8,15,22) (Pod 1-21)

day(1,8,15,22)							day(28)	
手技	点滴注射			手技	点滴注射		休薬完了	
薬品	生食(250)	1	本	薬品	生食(100)	1		本
					デキサート(3.3)	2		A
					ファモチジン	1		A
					ネオレスタール	1		A
点滴速度	20ml/h			点滴速度	200ml/h			
コメント等				コメント等				
	メインルート番目				側管 1 番目			
				手技	点滴注射			
				薬品	生食(100)	1		本
				点滴速度	100ml/h			
				コメント等				
					側管 2 番目			
				手技	点滴注射			
				薬品	エムプリシティ	10		mg/kg
					蒸留水(100ml) * 溶解用	1		本
					生食(250)	1		本
				点滴速度	1kur目初回	開始~30分	30ml/h	
						30分~60分	60ml/h	
						60分以降	120ml/h	
					1kur目2回目	開始~30分	180ml/h	
					30分以降	240ml/h		
	1kur目3,4回目及び2kur目以降		300ml/h					
コメント等								
	45-90分前に前投薬あり							
	側管3番目							

Day1,8,15,22 レナデックス28mg(エムプリシティ投与3-24時間前) 75歳以上減量基準あり
Day1,8,15,22 アセトアミノフェン300-1000mg(エムプリシティ投与45-90分前)
レブラミド25mg (Day1-21 7日間休薬)