

多発性骨髄腫 DLd (1kur目) (K28D1,8,15,22) (Pod 1-21)

day(1)				day(8,15,22)				day(28)	
手技	点滴注射			手技	点滴注射			休薬完了	
薬品	生食（500）	1	本	薬品	生食（250）	1	本		
点滴速度	20ml/h			点滴速度	20ml/h				
コメント等				コメント等					
	1 番目				1 番目				
手技	点滴注射			手技	点滴注射				
薬品	生食（100）	1	本	薬品	生食（100）	1	本		
	デキサート（3.3）	10	A		デキサート（3.3）	10	A		
用法				用法					
点滴速度	110ml/h			点滴速度	110ml/h				
コメント等				コメント等					
	2 番目				2 番目				
手技	点滴注射			手技	点滴注射				
薬品	生食（100）	1	本	薬品	生食（100）	1	本		
用法				用法					
点滴速度	50ml/h			点滴速度	50ml/h				
コメント等				コメント等					
	3番目				3番目				
手技	点滴注射			手技	点滴注射				
薬品	ダラザレックス	16	mg/kg	薬品	ダラザレックス	16	mg/kg		
	生食（500）	2	本		生食（500）	1	本		
点滴速度	開始～ 50ml/h			点滴速度	開始～ 50ml/h				
	1時間～ 100ml/h				1時間～ 100ml/h				
	2時間～ 150ml/h				2時間～ 150ml/h				
	3時間～ 200ml/h				3時間～ 200ml/h				
コメント等				コメント等					
	1～3時間前に前投薬あり				1～3時間前に前投薬あり				
	4番目				4番目				

Day1,8,15,22

ダラザレックスの投与1-3時間前にアセトアミノフェン1000mg、ポラミン2mg、モンテルカスト10mgを前投与
レブラミド25mg Day1-21 7日間休薬