

肺がん CBDCA+Pemetrexed+BV (K21D1)

day(1)				day(21)	
手技	点滴注射			休薬完了	
薬品	デキサート（3.3）	2	A		
	グラニセトロン（1）	1	A		
	アロカリス	1	本		
	生食（100）	1	本		
点滴速度	200ml/h				
コメント等	1番目				
手技	点滴注射				
薬品	生食（100）	1	本		
	アリムタ	500	mg/m ²		
点滴速度	500ml/h				
コメント等	2番目				
手技	点滴注射				
薬品	5%ブドウ糖（250）	1	本		
	カルボプラチン	5	AUC		
点滴速度	200ml/h				
コメント等	3番目				
手技	点滴注射				
薬品	ペバシズマブ	15	mg/kg		
	生食（100）	1	本		
用法					
点滴速度	100ml/h				
コメント等	4番目				
手技	点滴注射				
薬品	生食（100）	1	本		
用法					
点滴速度					
コメント等	5番目				
＜投与必要＞					
パンビタン末1 g 分1経口（初回投与の7日以上前～最終投与後22日まで）					
メチコバル注1000μ g 筋注（初回投与7日前および3kurごと）					
＜内服制吐剤＞					
状況によりデカドロン4mg分2（day2-4）追加					