

肺がん Pembrolizumab+CBDCA+Pemetrexed (K21D1)

day(1)				day(21)			
手技	点滴注射			手技	点滴注射		
薬品	グラニセトロン(1)	1	A	薬品	5%ブドウ糖(250)	1	本
	デキサート(3.3)	1	A		カルボプラチン	5	AUC
	デキサート(1.65)	1	A				
	アロカリス	1	A				
	生食(100)	1	本				
点滴速度	200ml/h			点滴速度	200ml/h		
コメント等	1番目			コメント等	5番目		
手技	点滴注射			手技	点滴注射		
薬品	キイトルーダ	200	mg/body	薬品	生食(100)	1	本
	生食(100)	1	本				
点滴速度	200ml/h			点滴速度			
コメント等	2番目			コメント等	6番目		
手技	点滴注射			休薬完了			
薬品	生食(50)	1	本				
点滴速度							
コメント等	3番目						
手技	点滴注射						
薬品	生食(100)	1	本				
	アリムタ	500	mg/m ²				
点滴速度	500ml/h						
コメント等	4番目						

<投与必要>
 パンビタン末1g分1経口（初回投与の7日以上前～最終投与後22日まで）
 メチコバル注1.000μg筋注（初回投与7日前および3kurごと）
 <内服制吐剤>
 状況によりデカドロン4mg分2（day2-4）追加