## 肺がん Nivo+Ipi+CBDCA+PTX (K42 D1,22)

day(1)								day(22)								day(42)
手技	点滴注射	1			点滴注射			手技	点滴注射	1		手技	点滴注射		1	
薬品	デキサート(3.3)	5	Α		オプジーボ(240)	1	V		デキサート(3.3)	5	Α	- - 薬品 -	オプジーボ(240)	1	V	7
	ファモチジン	1	Α		オプジーボ(120)	1	V		ファモチジン	1	Α		オプジーボ(120)	1	V	7
	ネオレスタール	1	Α	薬品	生食(100)	1	本	薬品	ネオレスタール	1	Α		生食(100)	1	本	
	グラニセトロン(1)	1	Α	采吅				_	グラニセトロン(1)	1	Α					
	アロカリス	1	Α						アロカリス	1	Α					
	生食(100)	1	本		200ml/h				生食(100)	1	本		200ml/h			
点滴速度	350ml/h			点滴速度	6番目			点滴速度	350ml/h			点滴速度	6番目			
コメント等	1番目			コメント筆	フィルター付きルート使用			コメント等	1番目			コメント等				
																4
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			
薬品	生食(50)	1	本	薬品	生食(50)	1	本		生食(50)	1	本	薬品	生食(100)	1	本	
								薬品								
																4
点滴速度	100ml/h			点滴速度	100ml/h			点滴速度	100ml/h			点滴速度	100ml/h			4
コメント等	2番目			コメント等	7番目			コメント等	2番目			コメント等	7番目			4
	L-subs S. di I				L-subs S. d. I											4
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射		. 2					
薬品	パクリタキセル	200	mg/m	薬品	ヤーボイ	1	mg/kg	-	パクリタキセル	200		_				
	生食(500)	1	本		生食(50)	1	本	薬品	生食(500)	1	本					<b>/</b>
				-				- 1								休薬完了
占海油度	170ml/h			占海油度	60ml/h			占海油度	170ml/h							
	2来口			無响处及	8番日			無响处皮	3悉日							
コメント等	フィルター付きルート使用			コメント等	ОШО	1		・ コメント等	5曲口							
手技	点滴注射	1			点滴注射			手技	点滴注射	1		1				
	5%ブドウ糖(250)	1	本	3.32	生食(100)	1	本	3.32	5%ブドウ糖(250)	1	本					
	カルボプラチン	6	AUC	薬品	<u> </u>	1	7-	薬品 基品	6	AUC	1					
	337113 3 7 2		7.00						337113 333	<u> </u>	7.00	1				
					フラッシュ用			-								
点滴速度	200ml/h			点滴速度				点滴速度	200ml/h			1				
	4来日							コメント等	4来口			1				
コメント等				コメント等				コメント寺				1				
手技	点滴注射						•	手技	点滴注射							
薬品	生食(50)	1	本						生食(50)	1	本	Ī				
								薬品								
点滴速度	フラッシュ用							点滴速度	フラッシュ用							
コメント等	5番目							コメント等	5番目							
コノノい守								コクノい守								

<内服制吐剤>

状況によりデカドロン4mg 分2(day2-4,22-25)追加

<sup>\*</sup>化学療法併用は1kurのみ。2kur目からはNivo+Ipiへ